

QUESTÃO 1

João, com idade de 8 anos portador de anemia falciforme é atendido em uma UBS, apresentando o quadro de febre elevada há 24h e sintomas gripais. Durante o período em que permanece na unidade em observação apresenta dor torácica e queda na saturação de hemoglobina (90%). Ausculta pulmonar: diminuída de forma discreta à esquerda. FC: normal. A hipótese diagnóstica e a conduta mais provável para esse quadro são:

- A) Embolia pulmonar aguda / Internação, anticoagulação com dose plena de heparina.
- B) Síndrome torácica aguda / Internação, analgesia, antibioticoterapia, e transfusão de hemácias.
- C) Embolia pulmonar aguda / Internação, anticoagulação com dose profilática de heparina.
- D) Síndrome torácica aguda / Observação por 24h, analgesia, evitar a transfusão de hemácias.

QUESTÃO 2

Rafael, com idade de 2 meses, apresenta estridor inspiratório, associado a tiragens sub e intercostais. Este quadro iniciou a partir do 10º dia, com leve progressão. Observam-se dificuldades nas mamadas, com algumas interrupções, sem cianose e o ganho pômbero-estatural está adequado. De acordo com o quadro clínico apresentado o diagnóstico mais provável é:

- A) Laringomalácia.
- B) Estenose subglótica.
- C) Hemangioma de laringe.
- D) Paralisia de cordas vocais.

QUESTÃO 3

Em atendimento no Ambulatório da Criança, a mãe relata, que há três meses observou a filha Letícia de 15 meses com aumento de volume abdominal, pelos pubianos e acne em face. No exame físico: bom estado geral, acne facial, PA: 90 x 50 mm Hg, pelos pubianos encaracolados, hipertrofia de clitóris e no abdômen: massa palpável em loja renal esquerda. A hipótese diagnóstica é:

- A) Linfoma não Hodgkin.
- B) Tumor do córtex suprarrenal.
- C) Tumor de Wilms.
- D) Neuroblastoma.

QUESTÃO 4

Maria encontra-se na 32ª semana de gestação, com exame (HbsAg positivo), portadora do vírus da Hepatite B. Marque a conduta correta de prevenção para não ocorrer a transmissão vertical ao recém-nascido:

- A) Aplicar Imunoglobulina humana até o 7º dia e vacina até uma hora de vida.
- B) Aplicar Imunoglobulina específica (HBIG) logo ao nascimento e vacina até o 7º dia.
- C) Aplicar Imunoglobulina específica (HBIG) até o 7º dia e vacina até 24 horas de vida.
- D) Aplicar Imunoglobulina humana logo ao nascimento e vacina com 30 dias.

QUESTÃO 5

Felipe, com idade de seis anos, portador de nefropatia crônica em uso de corticoide oral em dose > 2mg/ kg/dia, perdeu o cartão vacinal e precisa atualizá-lo. Não tem cicatriz de BCG visível. Em relação a vacinação dessa criança, é correto afirmar que:

- A) Aplicar vacina BCG pelo risco maior de desenvolver tuberculose.
- B) Aplicar vacina tríplice bacteriana e tríplice viral a qualquer momento da terapia.
- C) Aplicar todas as vacinas, pois o uso de corticoide nessa dosagem não é contraindicação.
- D) Não aplicar vacina tetraviral e febre amarela até interromper o tratamento por pelo menos um mês.

QUESTÃO 6

Joana, com idade de três anos, há três dias iniciou quadro de febre baixa (38°C), dor de garganta, mal-estar, diminuição do apetite e adenomegalias em região suboccipital e pós auriculares bilaterais, seguido de rash macular róseo claro, irregular, disseminado, iniciado em face e pescoço, distribuindo-se pelo corpo. Não há descamação após desaparecimento do mesmo. No início do quadro, o exame da orofaringe revelava lesões pequenas, de coloração rósea e petéquias em palato mole. Em relação ao quadro, o agente causal determinante é:

- A) Vírus da rubéola.
- B) Rotavírus.
- C) Norovírus.
- D) Vírus do sarampo.

QUESTÃO 7

Na consulta com pediatra a mãe relata que teme que seu filho Antônio de 2 anos fique desnutrido, faz tudo para que ela coma. No entanto, ele só aceita alimentos pastosos e líquidos, deixa o biscoito na boca até derreter e tem preferência por alimentos lácteos. Em função disso, ela cede e coloca suplementos no leite para tentar nutri-lo. A proposta adequada é:

- A) Utilizar inicialmente a coerção para alterar a preferência.
- B) Oferecer alimentos sólidos quando a criança solicitar leite.
- C) Evitar o uso de utensílios que a criança rejeite como colher.
- D) Observar, pois tal comportamento é normal até quatro anos de idade.

QUESTÃO 8

José, com idade de quatro anos, apresenta episódios recorrentes de hematúria macroscópica, principalmente quando em vigência de infecções de vias aéreas superiores. O diagnóstico mais provável é:

- A) Síndrome de Alport (Distúrbio Hereditário Genético).
- B) Glomerulonefrite difusa aguda.
- C) Doença de Berger (Nefropatia por IgA0).
- D) Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculite por IgA).

QUESTÃO 9

A vacina HPV (papiloma vírus humano) deve ser aplicada em crianças e adolescentes idealmente antes da exposição ao vírus. Segundo o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), devem ser vacinados:

- A) Meninas de 9 a 14 anos de idade.
- B) Meninas a partir de nove anos de idade.
- C) Meninos e meninas de 11 a 14 anos de idade.
- D) Meninos e meninas a partir de nove anos de idade.

QUESTÃO 10

Uma criança de 5 anos de idade diagnosticada previamente com Síndrome Nefrótica. Das situações abaixo, qual é indicativa de se realizar biópsia renal?

- A) Hematúria macroscópica por mais de 5 semanas.
- B) Dosagem de complemento C4 baixo.
- C) Idade de cinco anos.
- D) Paciente cortico-sensível.

QUESTÃO 11

Na avaliação secundária do paciente com suspeita de trauma ou em situação ignorada, são observados os sinais vitais e estado geral do paciente, com realização da entrevista:

- A) S.C.O.R.E.
- B) S.A.M.P.L.A.
- C) A.B.C.D.E.
- D) H.D.A. e revisão dos sistemas.

QUESTÃO 12

Uma paciente em pós-operatório recente, após episódios de náuseas e vômitos, queixa-se de dor e de contratura muscular. Ao exame físico, apresenta o sinal de Chvostek positivo. Qual o distúrbio metabólico mais associado ao quadro?

- A) Hipocalcemia.
- B) Hipocalemia.
- C) Hiponatremia.
- D) Hipoglicemia.

QUESTÃO 13

Baseado na resposta da questão anterior, qual a provável cirurgia a qual a paciente foi submetida?

- A) Adrenalectomia.
- B) Paratireoidectomia.
- C) Hipofisectomia.
- D) Pancreatectomia.

QUESTÃO 14

Em relação ao estudo da hernia inguinal, temos 2 importantes triângulos: O triângulo de Hessert e o triângulo de Hasselbach. Muitos consideram estes triângulos como sinônimos, porém, apresentam diferenças em seus limites. Qual das alternativas abaixo faz parte da delimitação de um triângulo, mas não de outro?

- A) Borda lateral do reto.
- B) Ligamento inguinal.
- C) Vasos epigástricos inferiores.
- D) Ligamento de Poupart.

QUESTÃO 15

Considerando fatores de risco para causas de deiscência de feridas operatórias, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada agravante:

- A) Obesidade.
- B) Uso crônico de corticosteroides.
- C) Presença de seroma e/ou hematoma.
- D) Extremos de idade (crianças e idosos).

QUESTÃO 16

Na cirurgia videolaparoscópica, o pneumoperitônio adequado é passo fundamental para a realização da cirurgia, porém pode ocasionar efeitos colaterais importantes. **NÃO** é um efeito esperado:

- A) Aumento da pressão venosa central.
- B) Diminuição do débito cardíaco.
- C) Hipocarbúria.
- D) Aumento da resistência vascular periférica.

QUESTÃO 17

Atualmente, o tratamento da pancreatite aguda é clínico, mesmo em casos mais graves. A indicação absoluta de cirurgia é:

- A) Apache > 35.
- B) Necrose infectada.
- C) Líquido peri-pancreático e edema pancreático severo.
- D) Ranson de 48 hs igual ou maior que 3.

QUESTÃO 18

Em relação ao câncer de próstata, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia é recomendado o início do **screening** para homens a partir de:

- A) 40 anos para a população geral.
- B) 40 anos para quem tem histórico familiar (+) e/ou raça negra.
- C) 45 anos para a população geral.
- D) 45 anos para quem tem histórico familiar (+) e/ou raça negra.

QUESTÃO 19

Paciente feminina, de 40 anos, uso crônico de corticoides, começou a apresentar dor em região de quadril esquerdo, com piora ao esforço, sendo que

a dor aumentou gradativamente, limitando a deambulação. Após 4 meses procurou o ambulatório de ortopedia com exame de RX de pelve mostrando aumento da densidade da cabeça do fêmur direito e fratura subcondral. O provável diagnóstico é:

- A) Sequela de epifisiólise da cabeça femoral.
- B) Fratura de colo de fêmur.
- C) Osteonecrose da cabeça femoral.
- D) Osteomielite do colo femoral.

QUESTÃO 20

A Osteoartrose, clinicamente, caracteriza-se como uma dor do tipo:

- A) Articular que piora progressivamente com esforço prolongado e de rigidez rápida.
- B) Óssea profunda e intensa, pior à noite, levando o paciente a despertar.
- C) Periarticular bem localizada com piora ao movimento ativo e contra resistência.
- D) Articular contínua, com rigidez matinal prolongada (>1h).

QUESTÃO 21

Você chega na Unidade Básica de Saúde tem mais de 10 pacientes aguardando atendimento. A primeira paciente do dia é a Dona Silvana que tem uma lista enorme de queixas ortopédicas e de saúde mental. Qual a melhor forma de abordagem a paciente:

- A) Dizer para a paciente que ela tem direito a escolher uma queixa para você poder ajudá-la hoje.
- B) Prescrever analgésicos e resolver as próximas queixas nas outras consultas.
- C) Enumerar as queixas e combinar de ir resolvendo durante o seguimento.
- D) Encaminhar para psiquiatria e ortopedia.

QUESTÃO 22

Na comunicação de más notícias, o correto é:

- A) Ser conciso e direto.
- B) Detalhar o ocorrido e deixar o familiar refletindo.
- C) Usar termos médicos específicos.
- D) Demonstrar o quanto também está emotivo.

QUESTÃO 23

Sobre o funcionamento da Atenção Primária à Saúde na comunidade, assinale a alternativa correta:

- A) Centraliza o atendimento nos agentes comunitários de saúde.
- B) Cadastra as famílias, define e caracteriza a comunidade.
- C) Visa a ampliação da necessidade de leitos hospitalares.
- D) Não prevê encaminhamento para consultas especializadas.

QUESTÃO 24

Uma Jovem procura a Unidade Básica de Saúde com relato insônia e crises de ansiedade frequentes. O médico ao investigar sobre o histórico da paciente, ela conta sobre um quadro de depressão na adolescência desencadeado por bullying, agravado após uma situação de abuso sexual. E que na época desenvolveu um quadro de automutilação, que foi tratado com psicoterapia e medicação - sertralina. Relata ainda que teve melhora do quadro, e suspendeu o tratamento há 7 anos. A conduta mais adequada nesse momento é:

- A) Indicar outro medicamento, visto que a sertralina não teve o efeito esperado e encaminhar para o psicólogo. Agendar retorno para 30 dias.
- B) Aconselhar a paciente a tentar evitar os pensamentos ansiosos, prescrever um sedativo para insônia e agendar retorno para 30 dias.
- C) Encaminhar para o grupo de mulheres vítimas de violência. Conversar sobre a possível reintrodução da medicação psicotrópica e agendar retorno para 15 dias.
- D) Repreender a paciente de que ela não deveria ter suspenso a medicação. Prescrever a sertralina e marcar retorno para 2 meses.

QUESTÃO 25

Paciente traz exames de rotina com Hemoglobina glicada de 13%, indicando uma diabetes muito descompensada, sendo necessário o uso de insulina. Porém, o paciente se mostra bem resistente. Das situações abaixo assinale a forma mais eficiente de comunicação ao favorecimento de adesão do paciente ao tratamento e autocuidado:

- A) O médico fala que os exames estão alterados e que vai iniciar a insulina. Sem nem aguardar a reação do paciente, segue explicando a técnica de aplicação.

- B) O médico fala sobre mudança no estilo de vida, opções medicamentosas e da evolução da doença. Orienta o que seria mais indicado para o paciente e se dispõe a sanar dúvidas.
- C) O médico mostra o exame e orienta que o paciente deve excluir da dieta açúcar e gordura. Entrega a receita da medicação, solicita novos exames e retorno para 3 meses.
- D) O médico diz que irá na casa do paciente duas vezes por dia para aplicar insulina, pois não quer que o paciente desista do tratamento.

QUESTÃO 26

São sinais de alto risco no atendimento pré-natal, exceto:

- A) Número excessivo de filhos.
- B) Demonstrar muitas expectativas em relação ao bebê.
- C) Gravidez não planejada.
- D) Múltiplas queixas psicossomáticas.

QUESTÃO 27

Sabe-se que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e que predispõe a várias doenças. As patologias que estão mais relacionadas são, exceto:

- A) Diarreia crônica e hipertensão.
- B) Câncer de mama e depressão.
- C) Dislipidemia e doença pulmonar.
- D) Síndrome metabólica e apneia obstrutiva do sono.

QUESTÃO 28

Os seguintes medicamentos são utilizados na abordagem terapêutica da fibromialgia, exceto:

- A) Nimesulida.
- B) Amitriptilina.
- C) Gabapentina.
- D) Citalopram.

QUESTÃO 29

Das situações comuns de visita domiciliar:
Assinale a alternativa correta.

- I. David, 17 anos, alta hospitalar há menos de 1 semana, PO de cirurgia ortopédica.
- II. Sr. João, 79 anos, com hemiparesia à esquerda, afasia e disfagia devido sequela de AVC.
- III. Dona Catarina, 52 anos, com diagnóstico de tuberculose.
- IV. Dona Esmeraldina, 70 anos com câncer colorretal em estágio terminal.

- A) II e IV
- B) II, III e IV
- C) I e IV
- D) I, II, III e IV

QUESTÃO 30

Em relação a administração de recursos financeiros, informações de pacientes e dados do sistema de saúde, assinale a alternativa correta:

- A) Os custos da saúde não são de responsabilidade do médico de família.
- B) O uso de um método clínico centrado na pessoa pode contribuir com a redução de custos.
- C) O prontuário médico é um documento do médico.
- D) Os exames mais tecnológicos devem estar disponíveis para todos os pacientes.

QUESTÃO 31

Ao se avaliar sintomas comuns na sua prática clínica diária, o médico deve manter como conduta, exceto:

- A) Determinar a importância desses sintomas e a necessidade de qualquer exame diagnóstico mais detalhado.
- B) Dada a gama de exames diagnósticos disponíveis é imperativo que cada médico aborde esses sintomas de uma maneira sistemática e que utilize os testes diagnósticos de forma racional.
- C) Apesar dos muitos avanços ocorridos no campo da medicina, cerca de 85% dos diagnósticos são emitidos corretamente, apenas com base em um histórico clínico detalhado e um exame físico.
- D) Geralmente se indica uma abordagem abrangente ao diagnóstico, na qual o médico solicita uma bateria de testes diagnósticos.

QUESTÃO 32

Quanto a conduta em casos de AVCi, pode-se afirmar que:

- A) Não se deve corrigir hipertensão arterial, com exceção se estiver acima de pressão sistólica (PS) 220 mmHg e pressão diastólica (PD) 120 mmHg.
- B) Se o paciente for submetido à terapia trombolítica, a pressão não pode exceder PAS 185 mmHg e PAD 110 mmHg, utilizando-se Nifedipina para controle.
- C) AVC isquêmico ou traumatismo de crânio nos últimos 6 meses representa um dos critérios de exclusão para tratamento trombolítico.
- D) A angiotomografia (ângio-TC) identifica oclusão de vasos proximais (carótida, cerebral média, basilar), no entanto, esta técnica de perfusão não permite aumentar o número de pacientes a receber terapia trombolítica ou trombectomia, em pacientes sem definição de tempo de sintomas.

QUESTÃO 33

Quanto a Escala de Coma de Glasgow em caso de traumatismo cranioencefálico, é incorreto afirmar:

- A) São considerados pacientes com TCE leve aqueles com 14 a 15 pontos na Escala de Coma de Glasgow.
- B) Avalia-se a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, variando-se o total de 1 a 15 pontos para se determinar se é TCE leve, moderado ou grave.
- C) Em todos os pacientes com Escala de Coma de Glasgow menor que 15, é indispensável a Tomografia Computadorizada do Crânio.
- D) A perda transitória da consciência e a duração da amnésia pós-traumática também devem ser consideradas na avaliação do estado da consciência.

QUESTÃO 34

Quanto a anemia ferropênica, é correto afirmar:

- A) É a principal causa de anemia macrocítica e hipocrômica.
- B) O ferro circula ligado a uma proteína transportadora, a ferritina.
- C) A redução do ferro sérico é o melhor exame para comprovar a anemia ferropênica.
- D) A melhor forma de tratamento é a administração de sais de ferro por via oral. A via parenteral tem indicações específicas e pode ser associada a eventos adversos graves.

QUESTÃO 35

Correlacione o medicamento anti-hipertensivo e o respectivo efeito adverso, optando pela alternativa de sequência correta:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Diurético | () Bradicardia |
| 2. Inibidor de ECA | () Hiperuricemia |
| 3. Bloqueador de canal de cálcio | () Tosse seca |
| 4. Beta-bloqueador | () Edema |

- A) 3,4,1,2
B) 2,3,4,1
C) 4,1,2,3
D) 1,2,3,4

QUESTÃO 36

Uma paciente de 60 anos, com histórico que sofreu queda da própria altura em sua residência, há cerca de quatro horas. Inicialmente foi levada por familiares a ESF de seu bairro e o médico da equipe a encaminhou para o PA de um Hospital do SUS, onde diagnosticou fratura de colo de fêmur. Após cerca de 24h do ocorrido iniciou com um quadro de insuficiência respiratória aguda evoluindo a óbito. Deve assinar a Declaração de Óbito:

- A) O médico da equipe de saúde da família.
B) O plantonista do PA do Hospital.
C) O médico do IML.
D) O médico do SVO.

QUESTÃO 37

Quanto ao tempo de tratamento para pneumonia de baixa gravidade adquirida na comunidade, é correto afirmar a duração do tratamento de:

- A) 5 dias.
B) 14 dias.
C) 21 dias.
D) 12 dias.

QUESTÃO 38

Representa sinal de alarme na dengue, exceto:

- A) Ascite.
B) Dor abdominal intensa e contínua.
C) Sangramento de mucosa.
D) Redução progressiva do hematócrito.

QUESTÃO 39

Quanto aos marcadores sorológicos da Hepatite B, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso e, após, indique a alternativa que apresenta a sequência correta:

- () Anti-HBc reagente comprova exposição prévia ao vírus.
() HBeAg reagente indica replicação viral.
() Desaparecimento do HBsAg indica resolução do quadro infeccioso.
() Surgimento de Anti-HBs pode indicar imunização prévia, mas não se correlaciona com a cura do processo infeccioso.
() Anti-HBc total e Anti-HBs reagentes indicam imunidade por resposta vacinal.

- A) V,V,F,F,V
B) V,V,V,F,F
C) F,F,F,V,V
D) F,V,V,F,F

QUESTÃO 40

Analizando e interpretando a gasometria arterial abaixo, é correto afirmar:

pH = 7,32 | PCO₂ = 40 mmHg | HCO₃⁻ = 19 mEq/L | BE = -5,0 mEq/L | pO₂ = 86

- A) Trata-se de acidose metabólica.
B) Trata-se de alcalose metabólica.
C) Trata-se de acidose respiratória.
D) Trata-se de alcalose respiratória.

QUESTÃO 41

No exame ginecológico de rotina verificou-se colo intensamente congesto e intensa secreção mucopurulenta que são características de:

- A) Cervicite Crônica.
B) Colpíte Difusa.
C) Cervicite Aguda.
D) Cervicocolpíte Focal.

QUESTÃO 42

Os leiomiomas são neoplasias benignas do útero, de acordo com a localização e o tipo, são responsáveis por sintomas de:

- A) Metrorragia e dismenorreia quando submucosos.
- B) Dor aguda por degeneração ou torção quando inteiramente intramurais.
- C) Aumento do fluxo menstrual e diminuição do intervalo menstrual quando inteiramente subserosos.
- D) Infertilidade e compressão de órgãos vizinhos quando submucosos pediculados.

QUESTÃO 43

Mariana de 28 anos de idade, casada há 05 anos, procura a UBS para consulta ginecológica, informa que não tem nenhum sintoma, que veio realizar exame de rotina. No exame especular observou-se a presença de cervicite, com sangramento endocervical durante a coleta de citologia cervicovaginal. O esfregaço obtido corado pelo Gram mostra diplococos Gram-negativos no citoplasma de polimorfonucleares neutrófilos. A conduta indicada é:

- A) Prescrever azitromicina por 3 dias para o casal.
- B) Prescrever ciprofloxacina e azitromicina para o casal.
- C) Enviar o material para cultura em meio de Tayer-Martin.
- D) Pesquisar clamídia por meio de RT-PCR.

QUESTÃO 44

A rotura uterina é considerada um episódio obstétrico grave, com risco de morte materna e perinatal. Quais dos sinais abaixo são evidentes de rotura uterina:

- A) Distensão segmentar, hemorragia e dor.
- B) Distensão segmentar, edema supra púbico e dor.
- C) Distensão segmentar, edema supra púbico e útero em ampulheta.
- D) Distensão segmentar, edema e hemorragia.

QUESTÃO 45

Pode-se afirmar que a placenta é um órgão:

- A) Fetal, composto pelas vilosidades coriais.
- B) Materna, composto pelas vilosidades coriais.
- C) Materno-fetal composto pelas vilosidades coriais.

- D) Materno-fetal, a materna pela decídua e fetal pelas vilosidades coriais.

QUESTÃO 46

Na infância a relação entre a dimensão do corpo e colo uterino é:

- A) Colo igual ao corpo do útero.
- B) Colo maior que o corpo do útero.
- C) Corpo maior que colo do útero.
- D) Até aproximadamente 12 meses o corpo e colo do útero são iguais.

QUESTÃO 47

Quanto ao líquido amniótico, é correto afirmar que:

- A) É translúcido no início da gravidez e turvo próximo ao termo, em parte decorrente de células descamadas do feto.
- B) Protege o feto contra impacto externos, além de atuar como reservatório glicêmico do feto.
- C) Tem sua composição influenciada pela quantidade de carboidratos absorvidos pelo feto.
- D) É formado por até 29% de material proteico, responsável pela hidratação e aporte proteico ao feto.

QUESTÃO 48

Analise as seguintes situações clínicas:

I - Paciente de 32 anos de idade com câncer de mama ductal invasivo não especial que fará quadrantectomia.

II - Paciente de 58 anos de idade com carcinoma de mama in situ unilateral em área de microcalcificações de 2 cm de extensão, que fará setorectomia.

III - Paciente de 72 anos de idade com nódulo axilar de 2 cm cuja punção por agulha fina evidenciou carcinoma ductal invasivo.

Indica-se a biópsia de linfonodo sentinela na(s) situação (ões) clínica(s) descritas em:

- A) II e III, apenas.
- B) I, apenas.
- C) I, II e III.
- D) I e II, apenas.

QUESTÃO 49

Das correlações a seguir todas são verdadeiras, exceto:

- A) Sífilis / Condiloma Plano.
- B) HPV / Condiloma Acuminado.
- C) Cancro Mole / Treponema.
- D) Gonorreia/ Diplococcus Gran Negativo.

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa correta.

Os ovários originam-se embriologicamente:

- A) Do ectoderme do sistema urogenital.
- B) Dos ductos paramesonéfricos.
- C) Dos ductos mesonéfricos.
- D) Dos três folhetos embrionários: ectoderme, endoderme e mesoderme.