



AValiação Preliminar do Potencial Doador

Realizar após a conclusão da ME pra definição de viabilidade de doação

RGCT:	Data:	Hora:	Telefone:	Falar com:
Hospital:			Unidade:	Leito:
PD:				D.N.:
Familiar Acompanhante:				Parentesco:
Sexo: ()M ()F	ABO:	Peso: Kg	Altura: cm	Perímetro Tórax: cm
PA: mmHg	T: °C	FC: bcpm	Diurese em 24hs:	Diurese: ml/kg/hora
Causa Morte Encefálica e Evolução Clínica: _____				

Data Internação:		UTI:	Data Intubação:	

CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS

- ☐ AIDS (HIV reativo)
- ☐ HTLV I/II reativo
- ☐ Encefalite virótica ou infecção virótica sistêmica
- ☐ Infecção ativa pelo CMV
- ☐ Infecção ativa pelo Herpes vírus
- ☐ Dengue
- ☐ Febre amarela
- ☐ Uso de drogas ilícitas endovenosas
- ☐ Sepses bacteriana ou fúngica (não tratada ou sem resposta terapêutica adequada)
- ☐ Sífilis (se não tratada)
- ☐ Doença de Chagas
- ☐ Tuberculose ativa
- ☐ Intoxicação por agrotóxicos (organoclorados ou organofosforados)
- ☐ Malária
- ☐ Zika
- ☐ Chikungunya
- ☐ SARS-CoV-2

Neoplasias:

- ☐ Astrocitoma anaplástico (grau III)
- ☐ Glioblastoma multiforme
- ☐ Meduloblastoma
- ☐ Oligodendroglioma anaplástico (Schmidt C e D)
- ☐ Ependimoma maligno
- ☐ Pineoblastoma
- ☐ Meningeoma anaplástico e maligno
- ☐ Tumor de células germinais (exceto teratoma bem diferenciado)
- ☐ Cordoma
- ☐ Linfoma cerebral primário

Anátomo Patológico () Sim () Não

CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS

- ☐ Hepatite B (HBsAg reativo)
- ☐ Hepatite C (HCV reativo)

TUMORES QUE NÃO EXLUEM O POTENCIAL DOADOR

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Meningioma benigno
☐ Adenoma de hipófise
☐ Schwannoma de acústico
☐ Craneofaringeoma
☐ Astrocitoma pilocítico (grau I) | ☐ Cisto epidermóide
☐ Cisto colóide do III ventrículo
☐ Papiloma de plexo coróide
☐ Hemangioblastoma
☐ Tumor de células ganglionais | ☐ Pineocitomas
☐ Oligodendroglioma de baixo grau (Schmidt A e B)
☐ Ependimoma
☐ Teratoma bem diferenciado |
|---|--|--|

Anátomo Patológico () Sim () Não

Conclusão:
